



Garden Starters Kit: PLANTING GUIDE

SEEDS



Vegetable	Variety	Seed Depth	Seed Spacing	Row Spacing	Days to Maturity	Planting/ Harvest Tips
Beets	<i>Boro</i>	1/2"	thin to 2"	12-18 in	50 days	Sow every two weeks until 8 weeks before frost. Harvest root and leaves.
Carrots	<i>Hercules</i>	1/4" to 1/2"	1' between plants	12-18 in	65-70 days	Thin seedlings; replant for multiple harvests
Cucumber	<i>Marketmore 76</i>	1/2"	1' between plants	5 ft between rows	58 days	Plant in warm soil. Watch for fungus/mildew
Green Beans (Bush)	<i>Provider</i>	1"	2 inches	1' row space	50 days	Harvest regularly to encourage fruiting
Kale	<i>Red Russian</i>	1/2"	3"-4"	18"-36"	50 days	Can be harvested at 29 days. Cold hardy.
Leaf Lettuce Mix	<i>All Star</i>	1/4" -1/2"	3" wide bands	6 inches	28 days (leaf)	Cut multiple times with knife. Can be re-seeded
Green Onions	<i>Guardsman</i>	1/4" -1/2"	1/4"	2-3" bands	50 days	Sow all summer. Loosen with fork and gather into a bunch.
Pumpkin	<i>Cinnamon Girl</i>	1/2"-1"	12"	2 ft.	85 days	Plant a few seed in a hill or in rows. Need a lot of space after first leaves show.
Radish	<i>Crunchy King F1</i>	1/2"	3/4"-1"	3"	23 days	Early spring planting. Harvest roots when 1" in diameter.
Snap Peas	<i>PLS141</i>	1/2"-1"	1.5"-3" rows	1.5' btw rows	64 days	Provide trellis for plants to climb.
Spinach	<i>Space F1</i>	1/2"	2-4" wide band	12"-18" inches	50 days	Sow in mid- to late summer for fall harvest. Clip young leaves with scissors
Squash - Butternut	<i>Waldo PMR</i>	1/2"-1"	3 feet between plants	6 feet between rows	85 days	4-5 seeds can be planted in mounds that are 6ft apart
Zucchini	<i>Dunja</i>	1"-1.5"	2ft. Plant spacing	6ft row spacing	50 days	Water soil, not leaves, to prevent mildew
Chives	<i>Staro</i>	1/4"	1"-3"	18" btw rows	75-85 days	Harvest individual leaves (flowers also edible). Used fresh or dried.
Cilantro	<i>Santo</i>	1/4" - 1/2"	2 in	12 - 18 in	50-55 days (leaf)	Leave for 90-105 days to harvest seed - coriander. Replant every 2-3 weeks.
Dill	<i>Bouquet</i>	1/8"-1/4"	1/2"	3"	40-45 days	Can thin to 4" for full plants. Sow in spring. Harvest leaves and flowers.
Parsley	<i>Wega</i>	1/4" - 1/2"	2"-3" wide bands	12"-18" rows	75 days	Thin plants to 8"-12" apart. Full sun. Multiple cuttings



Kit de Iniciación al Jardín: GUIA DE PLANTACION

SEMILLAS



Vegetal	Variedad	Cuán profundo	para semillas	Espacio para filas	Días a la cosecha	Notas de plantacion/cosecha
Remolacha	<i>Boro</i>	1/2"pulg.	Delgada a 2" pulg.	12"-18"pulg.	50 días	Siembre cada dos semanas hasta 8 semanas antes de las heladas. Cosecha raíz y hojas
Zanahoria	<i>Hercules</i>	1/4" to 1/2"pulg.	1' pie entre plantas	12"-18"pulg.	65-70 días	Plántulas delgadas; replantar para cosechas múltiples
Pepino	<i>Marketmore 76</i>	1/2"pulg.	1' pie entre plantas	5' pies entre filas	58 días	Plantar en suelo cálido. Esté atento a los hongos / moho.
Frijoles de Arbusto	<i>Provider</i>	1"pulg.	2"pulg.	Espacio de fila de 1' pie	50 días	Coseche con regularidad para fomentar la fructificación.
Repollo Rizado	<i>Red Russian</i>	1/2"pulg.	3"-4"pulg.	18"-36"pulg.	50 días	Se puede recolectar a los 29 días. Resistente al frío.
Lechuga de Hoja	<i>All Star</i>	1/4" - 1/2"pulg.	Bandas de 3" pulg.	6"pulg.	28 días (hoja)	Corta varias veces con un cuchillo. Se puede volver a sembrar
Cebollas Verdes	<i>Guardsman</i>	1/4" - 1/2"pulg.	1/4"pulg.	2"-3"pulg. bandas	50 días	Siembre todo el verano. Aflojar con un tenedor y juntar en un manojo.
Calabaza/ Auyama	<i>Cinnamon Girl</i>	1/2"-1"pulg.	12"pulg.	2' pies	85 días	Plante algunas semillas en una colina o en hileras. Necesita mucho espacio después de que se muestren las primeras hojas.
Rabano	<i>Crunchy King F1</i>	1/2"pulg.	3/4"-1"pulg.	3"pulg.	23 días	Plantación de principios de primavera. Coseche las raíces cuando tengan 1"pulg. de diámetro.
Chicharo/Arveja	<i>PLS141</i>	1/2"-1"pulg.	1.5"-3"pulg. filas	1.5' pies entre filas	64 días	Proporcione un enrejado para que las plantas trepen.
Espinaca	<i>Space F1</i>	1/2"pulg.	Bandas de 2"-4"pulg. de ancho	12"-18"pulg.	50 días	Siembre a mediados o finales del verano para la cosecha de otoño. Recorta las hojas tiernas con unas tijeras
Calabaza	<i>Waldo PMR</i>	1/2"-1"pulg.	3 pies entre plantas	6 pies entre filas	85 días	Se pueden plantar de 4 a 5 semillas en montículos separados por 6 pies
Calabacin	<i>Dunja</i>	1"-1.5"pulg.	Espacio entre plantas de 2 pies	Espacio entre filas de 6 pies	50 días	Riegue el suelo, no las hojas, para prevenir el moho.
Cebollino	<i>Staro</i>	1/4"pulg.	1"-3"pulg.	18"pulg. entre filas	75-85 días	Coseche hojas individuales (flores también comestibles). Usado fresco o seco.
Cilantro	<i>Santo</i>	1/4" - 1/2"pulg.	2"pulg.	12"-18"pulg.	50-55 días (hoja)	Dejar durante 90-105 días para cosechar la semilla: cilantro. Vuelva a plantar cada 2-3 semanas.
Eneldo	<i>Bouquet</i>	1/8"- 1/4"pulg.	1/2"pulg.	3"pulg.	40-45 días	Puede adelgazarse hasta 4 "para plantas completas. Siembre en primavera. Coseche hojas y flores.
Perejil	<i>Wega</i>	1/4" - 1/2"pulg.	Bandas de 2"-3" pulg. de ancho	12"-18" filas	75 días	Adelgace las plantas a 8 "-12" de separación. Pleno sol. Varios esquejes

TRANSPLANTS



Vegetable	Plant Spacing	Row Spacing	What to Harvest	Planting/Harvest Tips
Tomato - slicing, Roma	18-36 in	24-48 in	green or red fruit	Use a plant support (stake or cage), plant marigolds nearby to deter pests
Tomato - cherry tomatoes	18-36 in	24-48 in	ripe fruit will be yellow/orange	Use a plant support (stake or cage). Very sweet fruit.
Jalepeños	12-18 in	24-48 in	72 days to green fruit	Controlled exposure to cold can increase flowers and fruit. 82 days to red ripe fruit
Peppers -sweet peppers	18 in	24-48 in	green or red fruit	65-70 days to green fruit. 85-90 days to red ripe fruit.
Eggplant	12 in	24 in wide rows	Dark purple shiny skin fruit	65 -70 days to harvest fruit.
Collard Greens	18-24 in	24-36 in	large leaves	harvest after frost for best flavor - leaves 8-10in.
Tomatillo	24-36 in	24-36 in	Green fruit full in papery husk.	Plant deeply for deep rooting. 60 days to mature fruit.
Basil	4-8 in	18 in	Cut leaves or stems with leaves	Pinch off flowers to keep producing leaves.
Watermelon	1ft between plants	5ft btwn rows	Harvest fruit when heavy	Water in the transplants well. 80 days to maturity. Look for browning near the stem.

Pepper Pack Plus

Chilaca (Pasilla Bajio)	18 - 24 in	18 in	Harvest peppers when curved fruits are about 7 - 10 inches long; red to deep brown	Harvest at about 85 days. Cage or stake to support plants. Full sun (6-8 hours). Plants will be 24 to 30 inches tall. Chilacas are native to East Central Mexico
Habanero	14 - 16 in	24 - 36 in	Harvest peppers when 1 to 2.5 inches long, bright orange or red	Harvest at 80-90 days from planting. Cage or stake to support plants. Full sun (6-8 hours/day), Plants will be about 3 ft. tall. Habaneros are native to the Yucatan Peninsula in Mexico.
Poblano (Ancho)	12 - 24 in	24 - 36 in	Harvest peppers leaving a length of stem when pepper pods are about 3-6 inches, and turn dark red	Harvest at about 65 - 80 days. Cage or stake to support plants. Full sun (6-8 hours/day). Plants will be about 2 ft. tall. Pablanos are native to Puebla, Mexico.
Serrano	12 - 24 in	24 - 36 in	Harvest peppers at 3 - 6 inches green (unripe), or mature chilies of red, yellow, orange or brown	Harvest about 65 - 80 days from planting. Cage or stake to support plants. Full sun (6-8 hours/day). Plants can be 1-5ft tall. Serrano peppers are native to the Sierra Madre del Sur, south-central Mexico.
Papalo	12 in	18 in	Snip off fresh leaves as needed from top. Best used fresh. Harvest black seeds when ripe and dry for medicinal use.	Papalo is an annual herb that does best in full sun, that can tolerate some shade, and soil should be allowed to dry out between waterings. This herb is native to South & Central America and the American Southwest with a growth potential of (3 - 6) ft. tall with purple starburst flowers. Being a herb and a natural pest repellent papalo is also safe from diseases with no known disease susceptibility.
Epazote - See warning	4 - 6 in	12 - 18 in	Harvest after 55 days. Cut or tear young leaves from the center stem. Older leaves have a stronger flavor and should be used in small amounts.	Epazote grows best in full sun with moist, well-drained soil. In order to have a fresh supply of leaves it is suggested to make successive sowings of Epazote every 2-3 weeks. Epazote self-seeds very freely and may become invasive in the garden. Potting epazote is suggested. Native to Central and South America, this herb was prized by the Aztec culture for culinary and medicinal uses.

Warning! Pregnant or nursing women should not consume epazote in any form. No one should ingest the seeds or oil, which are poisonous. It's also wise to avoid consuming the flowering tips of stems.

Trasplantes



Vegetal	Espaciamiento de plantas	Distancia entre filas	Qué Cosechar	Consejos para plantar / cosechar
Tomate - rebanado, Roma	18"-36" pulg.	24"-48" pulg.	fruta verde o roja la fruta madura sera amarilla / naranja	Use un soporte para plantas (estaca o jaula), plante caléndulas cerca para disuadir a las plagas
Tomate - pequeños	18"-36" pulg.	24"-48" pulg.		Utilice soporte para plantas (estaca o jaula). Fruta muy dulce.
Jalepeños	12"-18" pulg.	24"-48" pulg.	72 días para la fruta verde	La exposición controlada al frío puede aumentar las flores y los frutos. 82 días para frutos rojos maduros
Pimientos	18" pulg.	24"-48" pulg. 24" en filas	fruta verde o roja	65-70 días para frutos verdes. 85-90 días hasta frutos rojos maduros.
Berenjena	12" pulg.	anchas	Fruta de piel brillante de color púrpura oscuro	65-70 días para cosechar frutos.
Hojas de berzas	18"-24" pulg.	24"-36" pulg.	hojas grandes	Coseche después de las heladas para obtener el mejor sabor: hojas de 8 a 10 pulgadas.
Tomatillo	24"-36" pulg.	24"-36" pulg.	Fruta verde reñena de una cascara parecida al papel.	Plante profundamente para un enraizamiento profundo. 60 días para madurar la fruta.
Albahaca	4"-8" pulg.	18" pulg. 5 pies entre	Cortar hojas o tallos con hojas.	Pelizque las flores para seguir produciendo hojas.
Sandía	1' pie entre plantas	filas	Coseche la fruta cuando sea pesada	Agua en los trasplantes bien. 80 días hasta el vencimiento. Busque un dorado cerca del tallo.

Paquete de Pimienta

Chilaca (Pasilla Bajio)	18"- 24" pulg.	18" pulg.	Coseche los pimientos cuando las frutas curvadas midan entre 7 y 10 pulgadas de largo; rojo a marrón oscuro	Cosecha a los 85 días aproximadamente. Jaula o estaca para sostener plantas. A pleno sol (6-8 horas). Las plantas tendrán de 24 a 30 pulgadas de alto. Las chilacas son nativas del centro-este de México.
Habenero	14" - 16" pulg.	24"- 36" pulg.	Coseche los pimientos cuando tengan de 1 a 2,5 pulgadas de largo, de color naranja brillante o rojo.	Cosecha a los 80-90 días desde la siembra. Jaula o estaca para sostener plantas. A pleno sol (6-8 horas / día), las plantas medirán aproximadamente 3 pies de altura. Los habaneros son nativos de la península de Yucatán en México.
Poblano (Ancho)	12" - 24" pulg.	24"- 36" pulg.	Coseche los pimientos dejando un largo de tallo cuando las vainas de los pimientos midan aproximadamente de 3 a 6 pulgadas y se vuelvan de color rojo oscuro	Cosecha entre 65 y 80 días. Jaula o estaca para sostener plantas. A pleno sol (6-8 horas / día). Las plantas medirán aproximadamente 2 pies de altura. Los poblanos son nativos de Puebla, México.
Serrano	12" - 24" pulg.	24"- 36" pulg.	Coseche pimientos de 3 a 6 pulgadas de color verde (inmaduros) o chiles maduros de color rojo, amarillo, naranja o marrón.	Coseche alrededor de 65 a 80 días después de la siembra. Jaula o estaca para sostener plantas. A pleno sol (6-8 horas / día). Las plantas pueden tener de 1 a 5 pies de altura. Los chiles serranos son nativos de la Sierra Madre del Sur, en el centro-sur de México.
Papalo	12" pulg.	18" pulg.	Corta las hojas frescas de la parte superior según sea necesario. Es mejor usarlo fresco. Coseche las semillas negras cuando estén maduras y secas para uso medicinal.	El papalo es una hierba anual que se desarrolla mejor a pleno sol, que puede tolerar algo de sombra y se debe permitir que la tierra se seque entre riegos. Esta hierba es originaria de América del Sur y Central y el suroeste de Estados Unidos con un potencial de crecimiento de (3 a 6) pies de altura con flores de color púrpura en forma de estrella. Al ser una hierba y un papalo repelente de plagas natural, también está a salvo de enfermedades sin susceptibilidad conocida a enfermedades.
Epazote - ¡Ver advertencia!	4"- 6" pulg.	12"- 18" pulg.	Cosecha a los 55 días. Corta o arranca las hojas jóvenes del tallo central. Las hojas más viejas tienen un sabor más fuerte y deben usarse en pequeñas cantidades.	Epazote crece mejor a pleno sol con suelo húmedo y bien drenado. Para tener un aporte fresco de hojas se sugiere realizar siembras sucesivas de Epazote cada 2-3 semanas. Epazote se siembra muy libremente y puede volverse invasivo en el jardín. Se sugiere macetas con epazote. Originaria de América Central y del Sur, esta hierba fue apreciada por la cultura azteca para usos culinarios y medicinales.

¡Advertencia! Las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia no deben consumir epazote en ninguna forma. También es aconsejable evitar consumir las puntas en flor de los tallos.